

Su mascota ha sido sometida a una cirugía mayor. Es extremadamente importante que lea y siga estas instrucciones. De no seguir las mismas, su mascota podría morir o sufrir lesiones.

El Día y la Noche después de la Cirugía:

- **La anestesia puede causar náuseas y vómitos.** Si esto ocurriera, por favor evite la comida y el agua durante la noche. Si los vómitos fueran excesivos o persistentes, por favor contacte a su veterinario.
- De no existir vómitos, podrá ofrecer una pequeña cantidad de comida y agua a su mascota.
- Podrá existir un pequeño sangrado proveniente de la incisión durante las primeras 24-48 horas. Cualquier sangrado de mayor envergadura deberá ser informado a un veterinario inmediatamente.
- **Para gatos: se deberá usar papel cortado en tiras o arena libre de polvo durante 5 días luego de la cirugía para evitar infecciones.**
- **Para los 10 Días Subsiguientes:**
- **Su mascota deberá permanecer en un lugar cálido y seco** y lo más quieta posible durante **10 días** luego de la cirugía. Los gatos y los perros deberán permanecer adentro durante 10 días.
- Los perros solo deberán salir para caminatas cortas, supervisadas y con correa.
- **Su mascota posee puntos cutáneos solubles. No** será necesario retirar los puntos, a menos que fuere observado de otra manera.
- **Asegúrese de revisar la incisión diariamente dos veces por día.** Los signos de infección son los siguientes: inflamación, enrojecimiento (la piel rosada o con costras es normal) sensibilidad, olor desagradable y/o secreción.
- Se podrá desarrollar un nudo duro en el lugar a la vista de la incisión. Esto es normal y desaparecerá con el tiempo.
- **Los problemas más comunes posteriores a la cirugía son causados por lamidas de la incisión.** La mejor manera de evitar esta situación es utilizar un Collar E (Collar Elizabethan). Este collar deberá ser usado **24 Horas por Día durante 10 días** y se deberá extender 1 ½ a 2 pulgadas sobre la nariz de la mascota.
- **No bañe a su mascota durante 10 días** luego de la cirugía. Mantenga el lugar de la incisión quirúrgica limpio y seco.
- Evite el contacto con otras mascotas durante las 48 horas posteriores. Si su mascota estuviera en celo, evite el contacto con machos intactos durante dos semanas.
- Su mascota **sí** experimentará dolor en el lugar de la incisión. **¡NO USE MEDICACION ANALGESICA DE VENTA LIBRE PARA HUMANOS!**
- Se ha aplicado a su mascota una inyección de medicación contra el dolor antes y luego de la cirugía. Para los gatos, esta inyección es una inyección de acción prolongada y puede durar 3 días. Para los perros, los enviamos a casa con 3 días de medicación oral para el dolor que comenzará la mañana posterior a la cirugía.
- Por favor limite el nivel de actividad de su mascota durante 10 días, aún si no mostrara signos de dolor. La medicación para el dolor a menudo causa que las mascotas sientan poco dolor o no lo sientan y a menudo tratarán de retomar los niveles de actividad normal.

NOTA: Si su mascota presentara un problema específicamente relacionado con esta cirugía, podrá volver a la clínica para realizar un examen de supervisión. Por favor llame e infórmenos sobre las inquietudes que hubiere notado, y programaremos una revisión para su mascota durante el mismo día. Este examen es gratuito; sin embargo, podrá cobrarse si alguna medicación fuere prescrita.

En caso de una emergencia fuera del horario de consultorio, por favor llame a su veterinario de cabecera o a una clínica de emergencias.